Пациент:		
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IG E К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

Параметр	Результат	Референсные значения
Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте)		
Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин)	REAST-Class 0	REAST-Class 0
Эпинефрин (адреналин)	REAST-Class 0	REAST-Class 0

Комментарий к результатам определения Ig E к аллергенам лекарств: Интерпретацию результата исследования проводит лечащий врач с учетом фармакологического анамнеза, истории заболевания и обследования пациента. Результат исследования имеет низкую информативность при длительном (более 6 месяцев) отсутствии контакта с аллергеном в связи с элиминацией циркулирующих антител Ig E. Исследование не применимо для диагностики и прогноза реакций гиперчувствительности II, III и IV типов, механизм развития которых не связан с выработкой иммуноглобулинов класса Ig E, а также токсических, психогенных, вегето-сосудистых и других видов побочных реакций на введение лекарственных веществ.

Интерпретация классов специфических IgE:
- REAST-Class 0 - отрицательный результат (менее 0.35 МЕ/мл);
- REAST-Class I - низкая концентрация антител (0.35-0.7 МЕ/мл);
- REAST-Class II - средняя концентрация антител (0.7-3.5 МЕ/мл);
- REAST-Class III - высокая концентрация антител (3.5-17.5 МЕ/мл);
- REAST-Class IV - очень высокая концентрация антител (17.5-50 МЕ/мл);
- REAST-Class V - интенсивно высокая концентрация антител (50-100 МЕ/мл);
- REAST-Class VI - крайне высокая концентрация антител (более 100 МЕ/мл).

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Дата готовности результата:

Дата печати результата: Результат выдал: _____
подпись