

Ветром сносит

Есть все в любых количествах и худеть – мечта многих людей, но данное явление не всегда имеет здоровую природу. Надо проверить несколько факторов.


Pервым снижением веса считают потерю более 10–15% исходной массы тела за шесть месяцев или более 5% за три месяца.

Это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, ведь вес – важный показатель. Истощение возникает на фоне нескольких отклонений.

ПРИЧИНА	ОСОБЕННОСТИ
Ограничение приема пищи, повышенные физические нагрузки.	Потеря веса составляет до 5–10 кг за месяц. Начинают выпадать волосы и слояться ногти, кожа становится дряблой, формируются белые растяжки. Типичные жалобы – слабость, апатия, сонливость.
В меню много хлеба и крупы, мало рыбы и мяса.	Сокращается содержание жировой и мышечной ткани, становятся заметными ребра, ключицы, kostи таза. Кожа бледнет, приобретает желтоватый оттенок, беспокоят головокружения, слабость.
Депрессия, утрата интереса к событиям и отсутствие аппетита.	Потеря веса достигает 10–15% от исходной массы тела, похудение сочетается с утомляемостью, сонливостью – иногда человек спит по 14–16 часов в сутки и не чувствует себя отдохнувшим. Кожа выглядит сухой и бледной, волосы выпадают, ногти слоятся и крошатся.
Гормональные сдвиги и нарушение обмена веществ. Происходит изменение метаболических процессов. Есть несколько видов эндокринных проблем – это сахарный диабет, гипертриеоз и гипопитуитаризм.	Если проблема возникла на фоне сахарного диабета, несмотря на повышенный аппетит, вес снижается на 5–10 кг. Наблюдаются головные боли и слабость, сильная жажда, увеличивается объем мочи. При гипертриеозе растет концентрация тироксина (гормона Т4) в крови. Пациенту постоянно хочется есть, но вес снижается. Затем количество принимаемой пищи уменьшается, что связано с затруднением глотания из-за увеличения объема щитовидной железы.
Патологии стенок кишечника.	При гипопитуитаризме падает или прекращается выработка гормонов гипофиза. Онемев веществ нарушается, вес резко уменьшается. Слабеют мышцы, работа внутренних органов нестабильна. Кожа становится сухой, истощенной, свисает складками.
Заболевания зубов, поражения слизистой рта на фоне травм и инфекций.	Состояние сопровождается интоксикацией, повышением температуры, аппетит ухудшается. При затяжных вирусных или бактериальных заболеваниях наблюдается потеря веса вплоть до истощения. Кожа бледнеет, глаза западают, становятся видны kostи скелета, волосы тускнеют и ломаются, ногти слоятся.
Онкологические заболевания.	Из-за нарушения всасывания питательных веществ вес снижается, но потеря редко достигает 10%. Возникает дефицит витаминов, что оказывается на внешних характеристиках волос и кожи. Язык становится ярко-красным и блестящим.



НАШ
КОНСУЛЬТАНТ
терапевт Клиники
инфекционных
заболеваний
ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии
Роспотребнадзора,
Ольга ПЛЕТМИНЦЕВА



Резкая потеря веса возможна при длительном приеме слабительных, нейролептиков, транквилизаторов, цитостатиков.

Фото Евгения Гриб

Ирина Ломанова, style@antennatv.ru