Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Замороженная плазма на геле (ЭДТА)

Параметр	Результат
Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода в крови матери)	См. приложение 1

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Дата готовности результата:
Дата печати результата: **Результат выдал:** _____
подпись

Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА

Замороженная плазма на геле (ЭДТА)

ПОЛ:
Возраст:
ИИН:
Дата взятия образца:
Дата печати результата:

Название исследования	Результат	Интерпретация результата
Выявление гена резус – фактора (RHD(плода	Выявлен	Резус-фактор плода: генотипически положительный..

Внимание: Данное исследование проводится только у серологически резус-отрицательной пациентки при сроке беременности более 8 недель.

Заключение:

Возможно развитие резус-конфликта..

Точность результата зависит от количества ДНК плода, обнаруживаемой в материнской плазме. Данная величина обусловлена состоянием плаценты и возрастает с увеличением срока беременности..
Определение резус-фактора методом ПЦР в режиме реального времени заключается в обнаружении гена RHD плода, кодирующего D-антиген, в крови матери..
Традиционный серологический метод основан на выявлении непосредственно D-антигена на эритроцитах крови..
Согласно литературным данным, в 99% исследований результаты, полученные серологическим методом и методом ПЦР., совпадают. Однако у 1% генотипически резус-положительных лиц серологическим методом может определяться отрицательный резус-фактор., что связано с мутациями в гене RHD и., как следствие, отсутствием или функциональной неполноценностью D-антигена.. Поэтому после родов рекомендуется уточнить резус-фактор ребенка серологическим методом..

_____
подпись