

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента

☐ Мужской☐ Женский

Дата рождения пациента

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность

Срок беременности

День цикла

Менопауза

Время взятия образца

Диагноз

Дата взятия образца

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

Внимание! Взятие крови для программ 300076, 300077, 300078 проводится после измерения уровня глюкозы в капиллярной крови натошак, при значении более 7,0 ммоль/л тест не проводится. Укажите уровень глюкозы в капиллярной крови натошак , ммоль/л.

Внимание! Для выполнения исследования необходимо обязательное присутствие всех указанных образцов. При взятии крови соблюдайте следующую последовательность заполнения пробирок: 1. Кровь (сыворотка). 2. Кровь с ЭДТА. 3. Кровь с флюоридом натрия.

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

☐ СИТО☐ приоритет
обычный

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

☐ 300076Пероральный
глюкозотолерантный тест

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза (натошак)

Образец № 1 из 2

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)

Образец № 2 из 2

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

☐ 300078Пероральный
глюкозотолерантный тест
(расширенный)

КРОВЬ (СЫВОРОТКА)

С-пептид (натошак)

Образец № 1 из 4

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза (натошак)

Образец № 2 из 4

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

☐ 300077Пероральный
глюкозотолерантный тест
(24-28 недель беременности)

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза (натошак)

Образец № 1 из 3

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза (через 1 час после нагрузки)

Образец № 2 из 3

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)

Образец № 3 из 3

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

КРОВЬ (СЫВОРОТКА)

С-пептид (через 2 часа после нагрузки)

Образец № 3 из 4

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)

Образец № 4 из 4

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

приоритет обычный

☐ 300087Постприанальная глюкоза
(через 2 часа после еды)

КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ

Глюкоза (через 2 часа после еды)

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300082Дифференциальная диагностика
форм сахарного диабета

КРОВЬ (СЫВОРОТКА)

Инсулин
С-пептид
АТ к β-клеткам поджелудочной железы (п.кол.)

На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2.

Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 г – 10 минут при T=+18+25 °C). Хранить при T=+2 +8 °C в первичной пробирке.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой!☒ Выбрать☐ Отменить

ZD07

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

☐ СИТО☐ приоритет
обычный

Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300079 Сахарный диабет – контроль лечения (ежеквартальный) КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)	Окружность талии см Артериальное давление / мм рт. ст. Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300085 Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет) КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Холестерин Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП Триглицериды КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300083 Инсулинорезистентность КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Инсулин Индекс НОМА КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)	Окружность талии см Артериальное давление / мм рт. ст. Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300086 Метаболический синдром – у детей и подростков первичная диагностика (10-17 лет) КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Холестерин Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП Триглицериды КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)
приоритет обычный Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 4 Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 4 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 4 Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 4 из 4	☐ 300080 Сахарный диабет – контроль лечения (ежегодный) часть 1 КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Общий белок Холестерин Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП Триглицериды Билирубин общий Мочевина Креатинин Na+/K+/Cl- АСТ АЛТ КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формой КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак) Суточный диурез мл Вес кг МОЧА (СУТОЧНАЯ) Проба Реберга Альбумин (микроальбумин)	приоритет обычный Окружность талии см Артериальное давление / мм рт. ст. Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 3 Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 3 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 3	☐ 300084 Лишний вес (с 18 лет) КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Холестерин Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП Триглицериды С-пептид Инсулин Индекс НОМА С-реактивный белок (высо-кочув.) Лептин Кортизол ТТГ КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)
Вакуумная пробирка со стабилизатором ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 300081 Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 2 МОЧА Общий анализ мочи Альбумин (микроальбумин)		

На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2.

Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 g – 10 минут при T=+18+25 °C). Хранить при T=+2 +8 °C в первичной пробирке.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой!☒ Выбрать
☐ Отменить

ZD07